

*Abies fraseri* (PURSH) POIRET

Englisch Fraser fir  
Deutsch Frasers Balsam-Tanne; Frasers-Tanne

Verbreitung:

Die Tanne ist nur in den US Staaten Virginia, North Carolina und Tennessee verbreitet.

In N- Virginia beginnt auch nach Norden das Verbreitungsareal der *A. balsamea*.

Genetische Differenzierung:

Die Arthybride *A. balsamea* x *A. fraseri* = *A. x phanerolepis* FERN. hat eine große Verbreitung, die von Labrador und Ontario in Kanada bis in den Norden von Virginia, USA reicht.

Bemerkungen:

Die Tanne ist in den Gebirgen der oben genannten US Staaten heimisch. Als typische Mischbaumart wächst sie zusammen mit *Picea rubra*, *Tsuga canadensis*, *Fagus grandifolia*, *Betula lutea*, *Prunus serotina*, *Sorbus americana* u.a.

Weiterführende Literatur:

LIU (1971); DALLIMORE et JACKSON (1966); SCHENCK (1939);

Örtliche Erfahrungen:

Die langsam wachsende, frostharte Tanne wird nur bis 12m hoch und ist kurzlebig. Ebenso wie die nahe Verwandte *A. balsamea* ist diese Tanne nur als junger Baum ansehnlich.

Der Anbau ist an kühlen, luft- und bodenfeuchten Standorten möglich.