

***Abies georgei* ORR**

Synonym: *Abies delavayi* var. *georgei* (ORR) MELVILLE.

Englisch	George fir
Chinesisch	Chang-bau-sha
Deutsch	George-Tanne

**Verbreitung:**

Beheimatet ist die *A. georgei* in den chinesischen Provinzen Yunnan, Sikang und Sichuan.

**Genetische Differenzierung:**

CHENG sieht die chinesischen Abies-Arten und-Varietäten mehr als eigenständige Arten, während LIU *A. forrestii* und *A. georgei* als Varietät zu *A. delavayi* stellt. Auch DALLIMORE et JACKSON stellen *A. faxoniana*, *A. forrestii* und *A. georgei* zu *A. delavayi*.

**Bemerkungen:**

Die im Vergleich zu *A. delavayi* und *A. forrestii* deutlich kleiner bleibende Hochgebirgstanne ist gegenüber den vorgenannten immer gut an den Zapfen mit langen hervorragenden, an der Spitze schwanzförmig ausgezogenen Deckschuppen und den dicht behaarten Jungtrieben erkennbar.

**Weiterführende Literatur:**

CHENG (1978); Liu (1971); DALLIMORE et JACKSON (1966);

**Örtliche Erfahrungen:**

Die *A. georgei* ist ebenso wie die *A. delavayi* und die *A. forrestii* aufgrund ihrer Winterfestigkeit für den Anbau geeignet. Jungpflanzen aus chinesischem Originalsaatgut werden z.Zt. mit den älteren vorhandenen Veredelungspflanzen überprüft.