

***Abies kawakamii* HAYATA**

Synonym: *A. mariesii* var. *kawakamii* MASTERS

Englisch	Taiwan fir
Deutsch	Taiwan-Tanne; Formosa- Tanne
Chinesisch	Taiwan Lien-sha

**Verbreitung:**

Die Tanne ist endemisch in Taiwan. Sie wächst in den höchsten Gebirgslagen von 2400 bis 3800 m über NN.

**Genetische Differenzierung:**

Die Art wurde früher von HAYATA zu *A. mariesii* gestellt, sie wird heute als eigenständige Art geführt.

**Bemerkungen:**

Eine Tanne der Hochlagen, die an steilen Nordhängen vorkommt und hohe Ansprüche an Boden- und Luftfeuchtigkeit stellt.

**Weiterführende Literatur:**

CHENG (1978); LIU (1971); DALLIMORE et JACKSON (1966);

**Örtliche Erfahrungen:**

Die Taiwan-Tanne scheint doch empfindlicher zu sein als manche Literaturangabe vorgibt. Wiederholt sind durch Wintereinwirkungen, aber auch durch Sommertrockenheit ganze Zweige abgestorben. Sie kann m.E. für einen Anbau nicht empfohlen werden. Die oben erwähnten Ansprüche verbunden mit einem ausgeprägt ozeanischen Klima in der Heimat können dieser Tanne hier wohl nicht geboten werden.