

Abies sutchuenensis (FRANCHET) REHDER et WILSON

Synonym: *A. kansouensis* (BORDERES-REY et GAUSSEN)

A. fargesii var. *sutchuenensis* (FRANCHET) REHD.et WILS.

Englisch	Sichuan fir
Deutsch	Sichuan-Tanne
Chinesisch	Tao-ho Lien sha

Verbreitung:

Beheimatet in den chinesischen Provinzen Kansu, Sichuan, Shensi, Hupeh und Sikang.

Genetische Differenzierung:

CHENG und LIU führen *A. sutchuenensis* als Varietät von *A. fargesii*.

GAUSSEN führt *A. sutchuenensis* als *A. kansouensis*.

DALLIMORE et JACKSON sehen sie als eigenständige Art.

Bemerkungen:

Ein Baum in den Gebirgen zwischen 2000 und 3600 m über NN mit auffallend rot-purpurbraunen 1 jährigen Trieben und purpurvioletten bis violett-schwarzen Zapfen.

Weiterführende Literatur:

CHENG (1978); LIU (1971); DALLIMORE et JACKSON (1966);

Örtliche Erfahrungen:

Ein völlig winterharter Baum mit sehr schöner Triebfarbe, mit deutlichen Stomabändern und auffallend gefärbten Zapfen. Die langsamwüchsige Tannenart ist zur Anpflanzung zu empfehlen.